

BERGO® Pect

Art.Nr.: 0812

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Lämmer und Ferkel
zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes
zur Unterstützung der physiologischen Verdauung

Inhaltsstoffe:

3,5 % Rohprotein	1,0 % Rohfett	6,0 % Natrium
0,1 % Lysin	8,0 % Rohfaser	1,5 % Kalium
0,1 % Methionin	18,0 % Rohasche	5,0 % Chlorid

Zusammensetzung:

Obsttrester (Apfel, Zitrus), getrocknet und speziell aufbereitet, Traubenzucker, Natriumchlorid, Natriumacetat, Flohsamenschalen, Kartoffelstärke, Maltodextrin, Natriumbicarbonat, Zichorienpulver, Johannisbrotpulver, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid

Fütterungsempfehlung:

Bei Gefahr von, während und nach Verdauungsstörungen (Durchfall) 2 mal täglich 1 - 2 g BERGO PECT pro kg Körpergewicht für 5 bis 7 Tage an Kälber, Lämmer oder Ferkel verfüttern (s. Fütterungshinweise).
"Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen."

Bezugsnummer der Partie: **s. Aufkleber**

Nettomasse: **5 kg**

Mindesthaltbarkeitsdatum:

Ergänzungsfutter einschl. Zusatzstoffe mind. haltbar bis:
s. Aufkleber

Mindesthaltbarkeit setzt handelsübliche, hygienische, trockene und kühle Lagerung voraus. Keine Haftung bei falscher Lagerung.

Zur Erzeugung von Lebensmitteln "ohne Gentechnik" geeignet. VLOG geprüft.

Fütterungshinweise:

Kälber und Lämmer:

1 bis 2 g BERGO® PECT pro kg Körpergewicht zweimal täglich in die Milch einrühren.

- bei Gefahr von Verdauungsstörungen 5-7 Tage lang in den kritischen Phasen (Umstellung von Vollmilch auf Milchaustauscher, Anfütterung von Zukaufskälbern).
- bei beginnenden bzw. leichten Durchfällen: 5-7 Tage lang
- in der Anfütterung mit Milchtränke nach schweren Durchfällen 5-7 Tage lang; außerdem Zwischenmahlzeit mit BERGIN® Lytopect-Tränke geben.

Ferkel:

1 bis 2 g BERGO® PECT pro kg Körpergewicht zweimal täglich in Milch/Wasser einrühren bzw. 10% in Milchaustauscherpulver oder Trockenfutter einmischen.

- bei Gefahr von Frühdurchfällen (erste Lebenswoche) in BERGIN® Ferkelmilch bzw. Trinkwasser einrühren.
- bei Gefahr von Absetzdurchfall bzw. bei leichten Durchfällen 1-7 Tage über das Futter geben.

Dosierungshinweis: 1 Stielmessbecher = 35g.

Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & Co.KG
Kronacher Str. 13, D-95326 Kulmbach
Tel. +49 9221 806-0

Anerk.-Nr. α DE-BY-1-00036

QS-Futtermittel: QS-ID 4031735000450



GMP+-anerkannt